



SENTRY (Сентрі) краплі від бліх, кліщів і комарів для собак **SENTRY**

Антипаразитарні краплі **TM SENTRY** містять піретроїди – інсектициди контактної дії, які вбивають бліх, кліщів та комарів безпосередньо при контакті, а не під час укусу. Піретроїди справляють на комах відлякуючий ефект.

Краплі **TM SENTRY** не тільки вбивають бліх, але і припиняють цикл їхнього розвитку за допомогою запатентованого регулятора росту комах (піріпроксифену), який ефективно знищує яйця і личинки бліх.

Активні інгредієнти: Перметрин – 45%, Піріпроксифен – 1,9%, решта інгредієнтів – 53,1%

Дістаньте піпетки з упаковки. Ножицями відріжте кінчик піпетки, направивши її у протилежний бік від обличчя. Утримуйте тварину однією рукою, другою рукою нанесіть розчин. Переверніть піпетку, вузьким кінцем розділіть шерсть і нанесіть вміст однієї піпетки на шкіру тварини у вигляді плями або лінії від основи голови до лопаток, для собак великих порід – до основи хвоста. Утримуйте тварину до повного всмоктування розчину.

Дозування для собак:

- для собак вагою до 7 кг піпетка 1 мл
- для собак вагою 7–15 кг піпетка 1,5 мл
- для собак вагою 15–30 кг піпетка 3 мл
- для собак вагою більше 30 кг піпетка 4,5 мл

Після завершення процедури загорніть піпетку в папір і викиньте.

Правила експлуатації. Не використовуйте продукт частіше одного разу на місяць. Продукт призначений тільки для собак та цуценят віком від 12 тижнів. Не застосовувати для кішок або інших тварин. Не купайте вихованця протягом 12 годин з моменту нанесення крапель. Якщо у Вас є інші тварини, ізолюйте обробленого собаку і не дозволяйте іншим вилизувати його до остаточного висихання розчину.

Тільки для собак. Тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати для цуценят віком до 3-х місяців. Перед застосуванням даного продукту на ослаблених, старих, хворих, вагітних і годуючих тваринах проконсультуйтеся з ветеринаром. Тварина може мати підвищену чутливість до будь-якого продукту, що містить пестициди. Помітивши ознаки прояву підвищеної чутливості, ретельно викупайте вихованця в теплій воді з милом. Якщо симптоми не зникнуть, проконсультуйтеся з ветеринаром. Симптоми чутливості до продукту можуть проявлятися у вигляді почервоніння шкіри, висипу, знебарвлення і випадання шерсті в місці нанесення препарату. Також у собак може відзначатися млявість. Деякі ліки не сумісні з інсектицидами. Перед застосуванням продукту на тварині, яка приймає медикаменти, проконсультуйтеся з ветеринаром.

Увага! Може викликати подразнення слизової оболонки очей середньої тяжкості. Уникайте контакту з очима та одягом. Уникайте потрапляння продукту в очі і пащу тварини. Після застосування крапель, перед їжею, питвом, курінням і т.д., ретельно вимийте руки водою з милом.

Перша допомога при попаданні в очі. Утримуйте очі у відкритому стані і промивайте водою протягом 15–20 хвилин. Якщо Ви носите контактні лінзи, зніміть їх у перші 5 хвилин і продовжуйте промивання. Зверніться до лікаря або в токсикологічний центр для подальшого лікування. Покажіть лікарю упаковку продукту.

Зберігання та утилізація. Діставайте піпетку з упаковки тільки безпосередньо перед застосуванням. Зберігайте в прохолодному (до 25°C) сухому місці, недоступному для дітей. Забороняється заморожувати. Не використовуйте та не зберігайте продукт у безпосередній близькості від опалювальних приладів і відкритого вогню. Не піддавайте впливу прямого сонячного світла.



SENTRY (Сентри) капли от блох, клещей и комаров для собак

SENTRY®

Антипаразитарные капли **TM SENTRY** содержат пиретроиды – инсектициды контактного действия, которые убивают блох, клещей и комаров непосредственно при контакте, а не при укусе. Пиретроиды обладают отпугивающим насекомых эффектом.

Капли **TM SENTRY** не только убивают блох, но и прекращают цикл их развития с помощью запатентованного регулятора роста насекомых (пирипроксифена), который эффективно убивает яйца и личинки блох.

Активные ингредиенты: Перметрин – 45%, Пирипроксифен – 1,9%, остальные ингредиенты – 53,1%

Достаньте пипетки из упаковки. Ножницами отрежьте узкий конец пипетки, направив ее в противоположную сторону от лица. Удерживайте животное одной рукой, второй рукой нанесите раствор. Переверните пипетку, узким концом разделите шерсть и нанесите содержимое одной пипетки на кожу в виде пятна или линии от основания головы до лопаток, для собак крупных пород – до основания хвоста. Удерживайте животное до полного впитывания раствора.

Дозировка для собак:

- для собак весом до 7 кг пипетка 1 мл
- для собак весом 7–15 кг пипетка 1,5 мл
- для собак весом 15–30 кг пипетка 3 мл
- для собак весом более 30 кг пипетка 4,5 мл

После завершения процедуры заверните пипетку в бумагу и выбросьте.

Правила эксплуатации. Не используйте продукт чаще одного раза в месяц. Продукт предназначен только для собак и щенков старше 12 недель. Не применять для кошек или других животных. Не купайте питомца в течение 12 часов с момента использования капель. Если у Вас есть другие животные, изолируйте обработанную собаку и не разрешайте им вылизывать ее до окончательного высыхания раствора.

Только для собак. Только для наружного применения. Не применять для щенков младше 3-х месячного возраста. Перед использованием данного продукта на ослабленных, старых, больных, беременных и кормящих животных проконсультируйтесь с ветеринаром. Животное может обладать повышенной чувствительностью к любому продукту, содержащему пестициды. Заметив признаки проявления повышенной чувствительности, тщательно выкупайте питомца в теплой воде с мылом. Если симптомы не исчезнут, проконсультируйтесь с ветеринаром. Симптомы чувствительности к продукту могут проявляться в виде покраснения кожи, сыпи, обесцвечивания и выпадения шерсти в месте нанесения препарата. Также у собак может отмечаться вялость. Некоторые лекарства не совместимы с инсектицидами. Перед использованием продукта на животном, принимающем медикаменты, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Внимание! Может вызвать раздражение слизистой глаз средней тяжести. Избегайте контакта с глазами и одеждой. Избегайте попадания продукта в глаза и рот животного. После использования капель, перед едой, питьем, курением и т.д., тщательно вымойте руки водой с мылом.

Первая помощь при попадании в глаза. Удерживайте глаза в открытом состоянии и промывайте водой в течение 15–20 минут. Если Вы носите контактные линзы, снимите их в первые 5 минут и продолжайте промывание. Обратитесь к врачу или в токсикологический центр для дальнейшего лечения. Покажите врачу упаковку продукта.

Хранение и утилизация. Доставайте пипетку из упаковки только непосредственно перед применением. Храните в прохладном (до 25°C) сухом месте, недоступном для детей. Не замораживайте. Не используйте и не храните продукт в непосредственной близости от отопительных приборов и открытого огня. Не подвергайте воздействию прямого солнечного света.